




ไข้เลือดออก

เจ็บไหม?

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ยุงลายจะได้รับเชื้อไวรัสจากเด็กที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกและแพร่ไปสู่เด็กคนอื่น ๆ เด็กที่ได้รับเชื้อมาใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และจะระบาดทุกในช่วงฤดูฝน หรือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน แต่แต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นจำนวนมาก





ยุงลายจะออกหากินในตอนกลางวัน มักหลบซ่อนตัวในที่มืด อาศัยและวางไข่ทั่วไปในชุมชน แหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายจะอยู่ตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น แจกัน จานรองขาตู้กับข้าว โอ่งน้ำ ภาชนะกักเก็บน้ำในห้องน้ำ จานรองกระถางต้นไม้ ยางรถยนต์เก่า กระจบอง กะละ เป็นต้น

รู้ได้อย่างไร?

ว่าเป็นโรคไข้เลือดออก


ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจะมีไข้สูงลอยอยู่ประมาณ 2-5 วัน ปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัว ส่วนใหญ่จะมีอาการหน้าแดง มีจุดแดงๆ ตามลำตัว แขน ขา บางรายมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนและเบื่ออาหาร ในรายที่มีอาการรุนแรง จะกระสับกระส่าย มือเท้าเย็น ผู้ป่วยที่มีภาวะช็อกส่วนใหญ่จะพูดคุยรู้เรื่อง ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษา อาจเสียชีวิตภายใน 12-24 ชั่วโมง หลังเริ่มมีภาวะช็อก



เด็กที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก



ยุงมีเชื้อไข้เลือดออก




ยุงลาย

การเดินทาง
ของโรค



เด็กปกติ



แหล่งเพาะพันธุ์ยุง

